

# Thymo Septine

**Thymoseptine** est un sirop pour la gorge à base de thym.

Le thym assainit, fluidifie et adoucit la gorge.

**Forme et présentation :** Sirop à usage oral. Flacon de 100 ml.

**Composition :** pour 100 ml.

Extrait fluide de feuilles thym 15g.

Saccharose, eau purifiée, humectant et raffermissant\* (SIN 422), éthanol.

\* Additif à usage alimentaire.

complément alimentaire

**Conseils d'utilisation :**

**Thymoseptine**, à base de thym : soulage les maux de gorge, enrouements, gorge irritée et cas de toux productive.

**Précaution d'emploi :**

**Thymoseptine** contient beaucoup de sucre, il est déconseillé aux diabétiques.

**Thymoseptine** contient de l'éthanol, à prendre en compte les enfants, les personnes consommant de l'alcool ainsi que les groupes à haut risque tels que les personnes atteintes d'une maladie

du foie ou d'épilepsie.

Allergie à l'un des constituants. Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires. Ne pas prendre **Thymoseptine** plus d'une semaine sans avis médical, si les symptômes subsistent ou en cas d'apparition de fièvre. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

**Utilisation en cas de grossesse ou d'allaitement :** nous ne disposons pas de données suffisantes pour exclure des effets néfastes éventuels pendant la grossesse ou l'allaitement. L'utilisation de **Thymoseptine** n'est pas recommandée durant ces périodes.

**Effets indésirables :** des réactions d'hypersensibilité ainsi que des troubles gastriques ont été observés, leur fréquence n'est pas connue.

**Interaction médicamenteuse :**

l'utilisation concomitante d'autres médicaments contenant de l'alcool

devrait être évitée.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

**Mode d'emploi :**

**Adultes et enfants de plus de 12 ans :** 15 ml 3 fois par jour.

**Enfants à partir de 7 ans :** 10 ml 3 fois par jour.

**Enfants à partir de 3 ans :** 5 ml 3 fois par jour.

À prendre de préférence après les repas.

Veillez à respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre chaque prise.

**Conservation :**

Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Conservation à température ambiante (15-25°C).

N'utilisez plus **Thymoseptine** après la date de péremption figurant sur l'emballage après la mention ("Exp") : les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux derniers l'année.

**Le produit est périmé le dernier jour du mois qui est indiqué.**

# تيموسبتين

**تيموسبتين** شراب للحلق مصنوع من المفرطة للمضافات الغذائية. انتهاء الصلاحية المحدد فوق العبوة الزعيترة.

الزعيترة تطهر، تحلل المخاط وتلين الحلق.

**الشكل و التقديم :** قارورة شراب سعة 100 مل. عن طريق الفم.

**المكونات :** لكل 100 مل. محلول مستخلص أوراق الزعيترة 15 غ.

السكروز، ماء نقي، مادة تنديية ومرسخة\* (SIN 422)، إيثانول.

\*مضاف لأعراض غذائية.

**نصائح الإستعمال :** تيموسبتين

يحتوي على مستخلص الزعيترة التي تعمل على تخفيف آلام الحلق، البحة، تهيج الحلق والسعال الناتج.

**إحتياطات الإستعمال :**

يحتوي تيموسبتين على كمية كبيرة من السكر، لا ينصح به لمرضى داء السكري.

يحتوي تيموسبتين على الإيثانول، ينبغي الإحتياط عند استعماله من طرف الأطفال، مستهلكي الكحول وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كالذين يعانون من مرض في الكبد أو الصرع. حساسية نحو أحد المكونات. لا يؤخذ

تيموسبتين لمدة تفوق الأسبوع دون استشارة طبية، في حالة تواصل الأعراض أو ظهور الحمى. قد يسبب الاستهلاك المفرط آثارا ملثية. لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية

تحتوي تيموسبتين على كمية كبيرة من السكر، لا ينصح به لمرضى داء السكري.

يحتوي تيموسبتين على الإيثانول، ينبغي الإحتياط عند استعماله من طرف الأطفال، مستهلكي الكحول وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كالذين يعانون من مرض في الكبد أو الصرع. حساسية نحو أحد المكونات. لا يؤخذ

تيموسبتين لمدة تفوق الأسبوع دون استشارة طبية، في حالة تواصل الأعراض أو ظهور الحمى. قد يسبب الاستهلاك المفرط آثارا ملثية. لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية

تحتوي تيموسبتين على كمية كبيرة من السكر، لا ينصح به لمرضى داء السكري.

يحتوي تيموسبتين على الإيثانول، ينبغي الإحتياط عند استعماله من طرف الأطفال، مستهلكي الكحول وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كالذين يعانون من مرض في الكبد أو الصرع. حساسية نحو أحد المكونات. لا يؤخذ

الزعيترة تطهر، تحلل المخاط وتلين الحلق.

**الشكل و التقديم :** قارورة شراب سعة 100 مل. عن طريق الفم.

**المكونات :** لكل 100 مل. محلول مستخلص أوراق الزعيترة 15 غ.

السكروز، ماء نقي، مادة تنديية ومرسخة\* (SIN 422)، إيثانول.

\*مضاف لأعراض غذائية.

**نصائح الإستعمال :** تيموسبتين

يحتوي على مستخلص الزعيترة التي تعمل على تخفيف آلام الحلق، البحة، تهيج الحلق والسعال الناتج.

**إحتياطات الإستعمال :**

يحتوي تيموسبتين على كمية كبيرة من السكر، لا ينصح به لمرضى داء السكري.

يحتوي تيموسبتين على الإيثانول، ينبغي الإحتياط عند استعماله من طرف الأطفال، مستهلكي الكحول وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كالذين يعانون من مرض في الكبد أو الصرع. حساسية نحو أحد المكونات. لا يؤخذ

تيموسبتين لمدة تفوق الأسبوع دون استشارة طبية، في حالة تواصل الأعراض أو ظهور الحمى. قد يسبب الاستهلاك المفرط آثارا ملثية. لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية

تحتوي تيموسبتين على كمية كبيرة من السكر، لا ينصح به لمرضى داء السكري.

يحتوي تيموسبتين على الإيثانول، ينبغي الإحتياط عند استعماله من طرف الأطفال، مستهلكي الكحول وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كالذين يعانون من مرض في الكبد أو الصرع. حساسية نحو أحد المكونات. لا يؤخذ

تيموسبتين لمدة تفوق الأسبوع دون استشارة طبية، في حالة تواصل الأعراض أو ظهور الحمى. قد يسبب الاستهلاك المفرط آثارا ملثية. لا ينصح بتناوله من طرف الأشخاص ذوي الحساسية و/أو الحساسية

تحتوي تيموسبتين على كمية كبيرة من السكر، لا ينصح به لمرضى داء السكري.

يحتوي تيموسبتين على الإيثانول، ينبغي الإحتياط عند استعماله من طرف الأطفال، مستهلكي الكحول وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كالذين يعانون من مرض في الكبد أو الصرع. حساسية نحو أحد المكونات. لا يؤخذ

**Magpharm**

ماف فارم ش ٥٠٠م٠٠ رقم الحصة  
من 124 الى 127 للمنطقة الصناعية  
سيدي خالد، بلدية واد البردي،  
دائرة الهاشمية، ولاية البويرة



Tilman

TILMAN S.A.  
ZA Sud 15 - B-5377 Ballebois  
www.tilman.be  
Belgique

تيلمان  
المنطقة الصناعية جنوب 15  
ب-5377- بون فيل  
بلجيكا

www.magpharm.com